Percentage of susceptible Organisms Isolated From stool, RMSc 11&11/1, 7 hospitals, Jan - Dec 2017

Organism	TOTAL ISOLATES	BETA - LACTAMS											CARBAPENEMS		QUINOLONES			AMINOGLYCOSIDES		MISCELLANEOUS		
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/ CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN / SULBACTAM	PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFAZOLIN (U)	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFEPIME	CEFOXITIN	IMIPENEM	MEROPENEM	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Salmonella, Non typhoidal	-		-												-	- [e]	- [e]				-	
Shigella spp.	-		-												-	- [e]	- [e]				-	
Vibrio cholerae (all serotypes)	-	-																		-	-	-
Vibrio parahaemolyticus	34			-	-	-	- [e]	- [e]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	96.9 (32)
Vibrio spp.	38			-	-	-	- [e]	- [e]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	97.2 (36)