Percentage of susceptible Organisms Isolated From Stool and Rectal Swab, RMSc9, 3 hospitals, Jan - Jun 2018

Organism	TOTAL ISOLATES	BETA - LACTAMS													CARBAPENEMS		QUINOLONES				AMINOGLYCOSIDES		GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS				
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/ CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN / SULBACTAM	PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFUROXIME SODIUM (parenteral)	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFEPIME	OXACILIN	CEFOXITIN	IMIPENEM	MEROPENEM	NALIDIXIC ACID	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	VANCOMYCIN BY MIC	TEICOPLANIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Salmonella, Typhoidal	-		-						-	-	-	-						-	- [e]	- [e]							-	-	
Salmonella, Non-typhoidal	-		-						-	-	-	-						-	- [e]	- [e]							-	-	
Shigella spp.	-		-														-	-	-	-								-	
Staphylococcus aureus	-	-											- [f]					-	-	-		-	-	- [e]	-	-	-	-	-
Vibrio cholerae (all serotypes)	-		-																								-	-	-
Vibrio cholerae O1	-		-																								-	-	-
Vibrio cholerae non O1, non O139	-		-																								-	-	-
Vibrio parahaemolyticus	-		-	-	-	-	- [e]		-	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-						-	-
Vibrio spp.	-		-	-	-	-	- [e]		-	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-						-	-