Percent Susceptibility of Organisms Isolated From Stool and Rectal Swab, 7 hospitals, RMSc 8, Jan - Jun 2016

Organism	TOTAL ISOLATES	BETA - LACTAMS													CARBAPENEM		QUINOLONES					AMINOGLYCOSIDES			GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS					
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN/SULBACTAM	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFAZOLIN (U)	CEFUROXIME SODIUM (parenteral)	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFEPIME	OXACILIN	CEFOXITIN	IMIPENEM	MEROPENEM	NALIDIXIC ACID	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	NORFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	NETILMICIN	VANCOMYCIN BY E-TEST	TEICOPLANIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	NITROFURANTOIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Salmonella Non-typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MIC -	-	MIC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigella flexneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MIC -	-	MIC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigella sonnei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MIC -	-	MIC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FOX -	-	-	-	-	-	-	Urine -	-	-	-	-	-	-	-	-	Urine -	-	-	-
Vibrio cholerae non O1, non O139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibrio parahaemolyticus	-	-	-	-	-	-	MIC -	MIC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibrio spp.	-	-	-	-	-	-	MIC -	MIC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-