Percentage of susceptible Organisms Isolated From Stool and Rectal Swab, RMSc 12 & 12/1, 8 hospitals, Jan - Jun 2018

Organism	TOTAL ISOLATES	BETA - LACTAMS													CARBAPENEMS		QUINOLONES				AMINOGLYCOSIDES		GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS				
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/ CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN / SULBACTAM	PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFUROXIME SODIUM (parenteral)	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFEPIME	OXACILIN	CEFOXITIN	IMIPENEM	MEROPENEM	NALIDIXIC ACID	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	VANCOMYCIN BY MIC	TEICOPLANIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Salmonella, Typhoidal	-																		[e]	[e]									
Salmonella, Non-typhoidal	366		60.3 (363)						93 (43)		97.6 (212)								[e]	[e]								100 (49)	
Shigella spp.	-																												
Staphylococcus aureus	-												[f]											[e]					
Vibrio cholerae (all serotypes)	-																												
Vibrio cholerae O1	-																												
Vibrio cholerae non O1, non O139	-																												
Vibrio parahaemolyticus	-						[e]																						
Vibrio spp.	-						[e]																						