Percentage of susceptible Organisms Isolated From Stool and Rectal Swab, Bangkok, 3 hospitals, Jan - Jun 2018

Organism	TOTAL ISOLATES	BETA LACTAMS													CARBAPENEMS		QUINOLONES				AMINOGLYCOSIDES		GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS				
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/ CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN / SULBACTAM	PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFUROXIME SODIUM (parenteral)	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFEPIME	OXACILIN	CEFOXITIN	IMIPENEM	MEROPENEM	NALIDIXIC ACID	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	VANCOMYCIN BY MIC	TEICOPLANIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	CHLORAMPHENICOL	COTRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Salmonella, Typhoidal	478		44.1 (476)						77.4 (62)	-	86.4 (411)	-						69.5 (478)	- [e]	- [e]							-	81.6 (478)	
Vibrio parahaemolyticus	40		0 (40)	-	-	-	- [e]		-	-		-		-	-	-		95 (40)	-	-	-	-						100 (40)	97.4 (39)